

**PROTOCOLE D'INTERVENTION EN CAS D'URGENCE  
A DESTINATION D'UN PERSONNEL NON MEDICAL**

*Dans le cadre d'un PAI pour Allergie*

**Elève concerné**

Nom : Prénom : Date de naissance : Adresse : <b>Téléphone des parents :</b>	Age :       <b>Poids de l'enfant :</b>	Établissement scolaire fréquenté : .....	Classe : .....
---	---	--	----------------

**INFORMATIONS A DONNER AU SAMU :**

Enfant allergique connu, il a un PAI avec une trousse d'urgence.....

<b><i>SYMPTOMES</i></b>	<b><i>CONDUITE A TENIR</i></b>
<b>Urticaire :</b> Plaques rouges qui gonflent et qui grattent (comme des piqûres d'orties) <b>Rhinoconjonctivite :</b> Œil rouge +/- gonflé, écoulement nasal abondant. <b>Mal au ventre inhabituel</b> avec ou sans vomissements ⇒ <b>Gonflement des lèvres sans gêne pour parler ou respirer</b>	<b>1) Antihistaminique :</b>  Si aggravation ou échec au bout de 10min : <b>2) Corticoïde :</b>  Faire le 15 éventuellement pour un conseil
<b>Asthme :</b> Toux +/- Gêne respiratoire +/- sifflement	1) Deux bouffées de bronchodilatateur à renouveler si besoin au bout de 5 minutes.(max 10 bouffées/heure) Si échec : 2) Corticoïde
<b>Œdème de Quincke, signes possibles:</b> Œdème des lèvres, sensation de picotements gorge et palais, visage gonflé, gêne respiratoire, toux rauque, modification de la voix, sensation d'asphyxie	<b>Appeler le SAMU</b> 1) Corticoïde  Si échec : 2) Injection d'ADRENALINE
<b>Asthme sévère:</b> gêne respiratoire s'aggravant malgré le bronchodilatateur.	<b>Appeler le SAMU et suivre ses instructions</b> 1) Corticoïde + bronchodilatateur 2) Injection d'ADRENALINE
<b>Association de 2 signes:</b> cutanés/respiratoires/ digestifs/vasculaires(malaise)	<b>Appeler le SAMU</b> Injection d'ADRENALINE
<b>Choc anaphylactique :</b> Malaise, asphyxie, perte de connaissance sans traumatisme préalable, avec ou sans vomissements	<b>Appeler le SAMU</b> Injection d'ADRENALINE et mettre en position latérale de sécurité

Date et signature du Médecin de  
l'Éducation Nationale

Date, signature et cachet du médecin traitant  
et/ou du médecin allergologue