

PROTOCOLE D'INTERVENTION D'URGENCE A DESTINATION D'UN PERSONNEL NON MEDICAL PIQUES D'HYMENOPTERES

ELEVE CONCERNE

Nom

Date de naissance :

Adresse :

.....

Etablissement fréquenté :

Prénom :

Classe :

Téléphone des parents :

.....

SIGNES D'APPEL

1) **A** Réaction locale cutanée

- Au niveau du point de piqûre
- Rougeurs, démangeaisons
- Douleur importante
- Gonflement
(Localisations dangereuses (bouche, tête))

1) **B** La réaction locale peut s'étendre :

- Urticaire géant (type piqûre d'ortie)
- Gonflement et démangeaisons
- Rougeur

2) **Manifestations générales, signes de gravités**

- Gêne respiratoire
- Asthme
- Voix changeante, rauque
- Gonflement de la langue et des lèvres (œdème de Quincke)
- Anxiété, essoufflement, palpitations
- Chaleur, sueurs, nausées, vomissements, malaise pouvant aller jusqu'à la perte de connaissance.

3) Tous ces signes peuvent apparaître en quelques minutes isolés ou ensemble et aboutit à une perte de connaissance (choc anaphylactique)

MESURES A PRENDRE

- 1) **A**
- enlever bague, bracelet sur le membre piqué.
 - enlever le dard si possible (pince à épiler)
 - désinfecter avec biseptine
 - appliquer un corticoïde sur la peau

1) **B** faire 1A puis

- donner les médicaments prescrits dans le PAI
- surveiller l'évolution et l'apparition des signes de gravité.

2) et 3)

Appeler le 15

- mettre l'élève sur le côté (PLS) la nuque en hyper extension et les pieds surélevés.
- aller chercher l'adrénaline (.....) et suivre les Instructions du médecin régulateur du SAMU.

INFORMATIONS A FOURNIR AU 15

- lieu de l'intervention
- signes présentés par l'élève
- antécédents et âge de l'enfant
- traitement habituel
- médicaments dont vous disposez à l'école

Sur les conseils du médecin du SAMU, l'infirmière ou ne personne volontaire de l'établissement pourra faire une injection sous-cutanée d'adrénaline (.....) selon les indications données par le SAMU.

INFORMER LA FAMILLE

Date et signature :

Cachet du médecin